

ISTRUZIONI D'USO

Art. PK06 - PK07

POLSIERA VOLARE IMMOBILIZZANTE

Grazie per aver scelto NewellMed, sinonimo di qualità e competenza nel settore ortopedico. Leggere attentamente le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del presidio.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

indicata nel post operatorio e nel controllo della mobilità del polso

PRECAUZIONI D'USO

Posizionare il tutore senza esercitare pressioni eccessive ed evitando l'applicazione su parti che presentino ferite o eccessivi gonfiori.

Per ogni dubbio applicativo rivolgersi al Tecnico Ortopedico di fiducia.

Si consiglia di indossare il dispositivo lontano da fiamme libere.

- Si consiglia la sostituzione del dispositivo quando si presenta usura o logorio anche parziale.

APPLICAZIONE

- 1) Calzare il tutore inserendo la mano fino al giro pollice.
- 2) Controllare l'esatta posizionatura della stecca volare.
- 3) Chiudere il tutore al polso adgendo sui cinturini a giro. Note: la polsiera è ambidestra, per l'applicazione sulla mano sinistra invertire la posizione della stecca volare e del puntuale giro pollice

n.b. La stecca laterale al 1° raggio deve essere posizionata / modellata al bisogno, dal Medico curante / Tecnico Ortopedico / Personale abilitato. Verificare che rimanga sempre un'elasticità residua per non provare stasi.

NOTE ED AVVERTENZE

Dispositivo medico di Classe I, fabbricato dalla Contel S.r.l. nella sua sede Strada delle Brigole, 46 23877 paderno d'Adda (LC) Italia in conformità alla Direttiva 93/42 CE.

Per l'utilizzo di questo dispositivo è consigliabile consultare un tecnico ortopedico od il medico curante per evitare ogni contro indicazione. Il giusto funzionamento del tutore e conseguente ad una corretta applicazione. Si consiglia l'utilizzo personale del prodotto. In caso di malfunzionamento rivolgersi al proprio riveditore di fiducia o contattare direttamente Contel S.r.l.. L'azienda non risponde in caso di uso improprio



ISTRUZIONI D'USO

Art. PK06 - PK07

POLSIERA VOLARE IMMOBILIZZANTE

Grazie per aver scelto NewellMed, sinonimo di qualità e competenza nel settore ortopedico. Leggere attentamente le istruzioni seguenti per un corretto utilizzo del presidio.

INDICAZIONI TERAPEUTICHE

indicata nel post operatorio e nel controllo della mobilità del polso

PRECAUZIONI D'USO

Posizionare il tutore senza esercitare pressioni eccessive ed evitando l'applicazione su parti che presentino ferite o eccessivi gonfiori.

Per ogni dubbio applicativo rivolgersi al Tecnico Ortopedico di fiducia.

Si consiglia di indossare il dispositivo lontano da fiamme libere.

- Si consiglia la sostituzione del dispositivo quando si presenta usura o logorio anche parziale.

APPLICAZIONE

- 1) Calzare il tutore inserendo la mano fino al giro pollice.
- 2) Controllare l'esatta posizionatura della stecca volare.
- 3) Chiudere il tutore al polso adgendo sui cinturini a giro. Note: la polsiera è ambidestra, per l'applicazione sulla mano sinistra invertire la posizione della stecca volare e del puntuale giro pollice

n.b. La stecca laterale al 1° raggio deve essere posizionata / modellata al bisogno, dal Medico curante / Tecnico Ortopedico / Personale abilitato. Verificare che rimanga sempre un'elasticità residua per non provare stasi.

NOTE ED AVVERTENZE

Dispositivo medico di Classe I, fabbricato dalla Contel S.r.l. nella sua sede Strada delle Brigole, 46 23877 paderno d'Adda (LC) Italia in conformità alla Direttiva 93/42 CE.

Per l'utilizzo di questo dispositivo è consigliabile consultare un tecnico ortopedico od il medico curante per evitare ogni contro indicazione. Il giusto funzionamento del tutore e conseguente ad una corretta applicazione. Si consiglia l'utilizzo personale del prodotto. In caso di malfunzionamento rivolgersi al proprio riveditore di fiducia o contattare direttamente Contel S.r.l.. L'azienda non risponde in caso di uso improprio



ARTICOLO
Dispositivo non biodegradabile, smaltire insieme ai normali rifiuti solidi urbani. Verifica le disposizioni del tuo comune



ARTICOLO
Dispositivo non biodegradabile, smaltire insieme ai normali rifiuti solidi urbani. Verifica le disposizioni del tuo comune

USER GUIDE

Art. PK06 - PK07

VOLAR WRIST BRACE FOR THUMB IMMOBILIZATION

Thank you for choosing NewellMed synonym of quality and competence in orthopedic field. Please read the following instruction carefully for a correct use of the product.

THERAPEUTIC INDICATIONS

Recommended in post-surgical period of carpal tunnel and in subluxations of the first metacarpophalanged joint

PRECAUTIONS FOR USE

Position the support without exerting too much pressure and avoiding the application on injured or swollen parts.

For any question, please contact the Orthopaedic Technician.

It's not recommended to wear the support near open flames

-It is recommended to replace the device when there is wear or tear, even partial

APPLICATION INSTRUCTION

- 1) Insert the thumb in the specific pocket.
- 2) Fasten the support around the wrist.
- 3) Adjust the velcro fastening at the thumb
- 4) Ensure the stability closing the velcro strap around the wrist

n.b. The lateral splint has to be placed or molded by the doctor or the Orthopaedic Technician. Verify that there is a residual elasticity to prevent stasis.

NOTES AND WARNINGS

Class I medical device, manufactured by Contel S.r.l. at its headquarters in Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italy in accordance with Directive 93/42 CE.
For the use of this device is advisable to consult a doctor or orthopedic technician to avoid any contraindications. The proper functioning of the brace is the result of a correct application We recommend personal use of the product. In case of malfunction contact your local dealer or contact Contel S.r.l.. The company is not liable for misuse of the product.



USER GUIDE

Art. PK06 - PK07

VOLAR WRIST BRACE FOR THUMB IMMOBILIZATION

Thank you for choosing NewellMed synonym of quality and competence in orthopedic field. Please read the following instruction carefully for a correct use of the product.

THERAPEUTIC INDICATIONS

Recommended in post-surgical period of carpal tunnel and in subluxations of the first metacarpophalanged joint

PRECAUTIONS FOR USE

Position the support without exerting too much pressure and avoiding the application on injured or swollen parts.

For any question, please contact the Orthopaedic Technician.

It's not recommended to wear the support near open flames

-It is recommended to replace the device when there is wear or tear, even partial

APPLICATION INSTRUCTION

- 1) Insert the thumb in the specific pocket.
- 2) Fasten the support around the wrist.
- 3) Adjust the velcro fastening at the thumb
- 4) Ensure the stability closing the velcro strap around the wrist

n.b. The lateral splint has to be placed or molded by the doctor or the Orthopaedic Technician. Verify that there is a residual elasticity to prevent stasis.

NOTES AND WARNINGS

Class I medical device, manufactured by Contel S.r.l. at its headquarters in Strada delle Brigole, 46 23877 Paderno d'Adda (LC) Italy in accordance with Directive 93/42 CE.
For the use of this device is advisable to consult a doctor or orthopedic technician to avoid any contraindications. The proper functioning of the brace is the result of a correct application We recommend personal use of the product. In case of malfunction contact your local dealer or contact Contel S.r.l.. The company is not liable for misuse of the product.



MAINTENANCE

-hand washing with maximum temperature 30° using mild soap.

-Don't bleach.

-Don't iron.

-Dry away from direct heat sources and store in a cool place.



ITEM
non-biodegradable device, dispose with normal municipal solid waste check the provisions of the municipality of residence

MAINTENANCE

-hand washing with maximum temperature 30° using mild soap.

-Don't bleach.

-Don't iron.

-Dry away from direct heat sources and store in a cool place.



ITEM
non-biodegradable device, dispose with normal municipal solid waste check the provisions of the municipality of residence